

MATERIAL ADICIONAL

Tabla 1 del material adicional. Características basales de pacientes con trombosis muy tardías del *stent* con y sin neoateroesclerosis. Los resultados se expresan en porcentaje (%)

	Neoateroesclerosis	No neoateroesclerosis	p
<i>Diabetes Mellitus</i>	23,5	38,9	0,4
Dislipemia	73,1	52,7	0,16
Fumador	52,9	50	1
Insuficiencia renal crónica	11,8	22	0,4
Angioplastia otro vaso	50	50	1
Infarto Previo	53	72	0,293
<i>Stent</i> solapados	20,6	11	0,47
Tipo <i>stent</i>			
Convencional	47	38,9	0,7
Farmacoactivo	52	61	
ALM	$1,65\text{mm}^2 \pm 0,94$	$2,62 \pm 1,3\text{mm}^2$	0,006
Área del <i>stent</i> mínima	$6 \pm 2 \text{ mm}^2$	$4,5 \pm 1,2\text{mm}^2$	0,004
<i>Frames struts</i> no cubiertos	$4,1 \pm 3,8$	$45,3 \pm 67,3$	< 0,001
<i>Frames struts</i> malapuestos	$5,55 \pm 2,3$	$13,6 \pm 6,1$	< 0,01

Tabla 2 del material adicional. Características de pacientes con neoateroesclerosis con y sin rotura de placa. Los valores expresados son porcentajes (%)

	Rotura placa (n=16)	No rotura placa (n=24)	p
Fumador	35,7	62	0,2
Dislipemia	76,1	68,8	0,41
Infarto previo	71,4	50	0,342
<i>Stent</i> solapados	20,6	11	0,47
Tipo <i>stent</i>			
Convencional	42,3	50	0,9
Farmacoactivo	57	50	
Presencia de calcio	21	25	1
Presencia de neovasos	21,4	33,3	0,48
> 1 Angioplastia lesión diana	14,3	20,8	1

Figura 1 del material adicional. Curvas de supervivencia libres de evento combinado (izquierda) y de mortalidad cardiovascular (derecha).

