https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

MATERIAL ADICIONAL

Tabla S1. Características angiográficas y revascularización coronaria

	Total (n=982)	Ingreso en horario laboral (n=341)	Ingreso fuera del horario laboral (n=641)	p	Ingreso en día laborable (n=670)	Ingreso en día no laborable (n=312)	p
Coronariografía							
Acceso vascular radial (%)	928 (94,5)	324 (95,0)	604 (94,2)	0,323	629 (93,9)	299 (95,8)	0,332
Lesiones significativas en los 3 vasos principales (%)	212 (21,6)	83 (24,3)	129 (20,1)	0,206	149 (22,2)	63 (20,2)	0,704
Lesión significativa de TCI	126 (12,8)	47 (13,8)	79 (12,3)	0,515	93 (13,9)	33 (10,6)	0,150
Alguna oclusión crónica (%)	144 (14,7)	61 (17,9)	83 (12,9)	**0,037**	96 (14,3)	48 (15,4)	0,663
Tratamiento definitivo				0,573			0,721
- **Revascularización percutánea (%)**	805 (82,0)	275 (80,6)	530 (82,7)		536 (81,5)	259 (83,0)	
- **Revascularización quirúrgica (%)**	96 (9,8)	38 (11,1)	58 (9,0)		69 (10,3)	27 (8,7)	
- **Tratamiento médico (%)**	81 (8,2)	28 (8,2)	53 (8,3)		55 (8,2)	26 (8,3)	
Intervencionismo coronario (n=805)							
Implante de *stent* (%)	759 (94,4)	260 (94,9)	499 (94,2)	0,662	515 (94,5)	244 (94,2)	0,869
- ***Stent* farmacoactivo (%)**	756 (99,6)	259 (99,6)	497 (99,6)	0,998	504 (97,8)	242 (99,2)	0,988
- **Nº *stents* implantados**	1,6 ± 1,2	1,7 ± 1,8	1,7 ± 1,2	0,538			
- **Longitud total con *stent* (mm)**	38,1 ± 32,6	37,3 ± 30,2	38,7 ± 33,9	0,590			
Tromboaspiración (%)	36 (4,5)	9 (3,3)	27 (5,1)	0,237	26 (4,8)	10 (3,9)	0,557
Balón farmacoactivo (%)	116 (14,8)	37 (13,6)	79 (15,4)	0,506	75 (14,0)	41 (16,3)	0,393
Imagen intracoronaria (%)	122 (15,2)	48 (17,0)	74 (14,2)	0,303	87 (15,9)	35 (13,7)	0,411
Anti IIb/IIIa durante el procedimiento (%)	21 (2,6)	6 (2,2)	15 (2,8)	0,583	13 (2,4)	8 (3,1)	0,561
Cangrelor durante el procedimiento (%)	14 (1,7)	4 (1,5)	10 (1,9)	0,661	11 (2,0)	3 (1,2)	0,566
Revascularización en 2 tiempos (%)	77 (9,6)	23 (8,4)	54 (10,2)	0,412	52 (9,6)	25 (9,7)	0,979
Cirugía de revascularización coronaria (n=96)							
Tiempo desde el ingreso a la cirugía (días)	10,0 ± 7,9	10,6 ± 7,9	9,8 ± 6,3	0,551	10,6 ± 7,1	8,7 ± 6,5	0,252
Tiempo desde la coronariografía y la cirugía (días)	8,2 ± 7,4	8,3 ± 7,3	8,1 ± 6,3	0,851	8,6 ± 6,8	6,9 ± 6,5	0,267
Revascularización completa (%)	78 (80,4)	33 (82,5)	45 (78,9)	0,664	59 (83,1)	19 (73,1)	0,271
- **Revascularización completa con injertos arteriales (%)**	30 (38,4)	11 (33,3)	19 (42,2)	0,555	23 (39,9)	7 (36,8)	0,549

TCI: tronco coronario izquierdo.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

Tabla S2. Análisis de los pacientes que presentaron el evento principal intrahospitalario

	Evento intrahospitalario (n=96)	Sin evento intrahospitalario (n=886)	p
Edad (años)	72,1 ± 10,4	65,6 ± 12,8	**<0,001**
Sexo femenino (%)	23 (24,0)	207 (23,4)	0,896
Índice de masa corporal (kg/m2)	28,6 ± 5,6	27,6 ± 4,5	0,070
Características clínicas basales			
Hipertensión arterial (%)	80 (83,3)	597 (67,4)	**0,001**
Diabetes Mellitus (%)	52 (54,2)	284 (32,1)	**<0,001**
Enfermedad cerebrovascular (%)	13 (13,5)	56 (6,3)	**0,009**
Enfermedad renal crónica (%)	29 (30,2)	85 (9,6)	**<0,001**
EPOC (%)	11 (11,5)	89 (10,0)	0,664
Fibrilación/Flutter auricular (%)	12 (12,5)	63 (7,1)	0,059
Insuficiencia cardiaca (%)	6 (6,3)	36 (4,1)	0,314
Infarto de miocardio previo (%)	30 (31,3)	195 (22,0)	**0,041**
Fragilidad (%)	13 (14,0)	65 (7,5)	**0,003**
Características asistenciales			
Se realiza actividad de tarde (%)	44 (10,5)	52 (9,3)	0,523
Se realiza actividad de fin de semana para casos seleccionados (%)	16 (7,4)	80 (10,4)	0,178
2 o más salas de intervencionismo (%)	56 (58,3)	570 (64,2)	0,245
6 o más hemodinamistas (%)	17 (17,7)	219 (24,78)	0,127
Momento del ingreso			
Ingreso durante el horario laboral (%)	34 (35,4)	307 (34,7)	0,881
Ingreso en día laborable (%)	72 (75,0)	598 (67,5)	0,134
Situación clínica al ingreso			
IAMSEST al ingreso (%)	86 (89,6)	668 (75,4)	**0,002**
Alteraciones en el ECG (%)	74 (77,1)	526 (59,4)	**<0,001**
Killip-Kimball > I (%)	30 (31,2)	74 (8,4)	**<0,001**
Parada cardiorrespiratoria (%)	1 (1,0)	2 (0,2)	0,266
Arritmias ventriculares (%)	2 (2,1)	3 (0,3)	0,078
Pico de CPK (u/L)	420,4 ± 547,6	344,0 ± 748,8	0,483
Tratamiento antitrombótico previo a la coronariografía			
AAS pre-cateterismo (%)	95 (99,0)	874 (98,6)	0,799
Doble antiagregación (%)	65 (67,7)	618 (69,8)	0,679
Anticoagulación (%)	75 (79,8)	671 (76,3)	0,556
Coronariografía			
Tiempo hasta la coronariografía (h) - **< 24 horas (%)** - **24 – 72 horas (%)** - **> 72 horas (%)** - **<12h (%)** - **<24h (%)** - **<72h (%)**	41 (20 – 74) 37 (38,5) 35 (36,5) 23 (24,0) 14 (14,6) 38 (39,6) 73 (76,0)	32 (17 – 71) 286 (32,3) 363 (41,0) 237 (26,6) 88 (9,9) 287 (32,4) 650 (73,4)	0,183 0,457 0,156 0,155 0,572
Test no invasivo previo (%)	5 (5,2)	74 (8,4)	0,282

AAS: ácido acetilsalicílico; CPK: creatinfosfocinasa; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

Tabla S3. Modelo multivariable para el evento combinado intrahospitalario

	OR cruda (IC 95%)	p	OR ajustada (IC 95%)	p
Modelo 1. Horario no laborable vs horario laborable				
Edad (años)	1,05 (1,03 - 1,07)	<0,001	1,03 (1,01 – 1,05)	0,014
Diabetes Mellitus	2,51 (1,64 - 3,83)	0,001	1,63 (1,02 – 2,60)	0,042
Fragilidad	1,98 (1,05 – 3,74)	0,036	1,04 (0,51 – 2,10)	0,923
Enfermedad renal crónica	4,08 (2,50 - 6,66)	<0,001	2,16 (1,25 – 3,72)	0,006
Infarto de miocardio previo	1,61 (1,02 - 2,55)	0,042	1,17 (0,71 – 1,95)	0,529
Presentación clínica como IAMSEST	2,81 (1,43 - 5,48)	0,003	2,21 (1,09 – 4,48)	0,027
Cambios electrocardiográficos iniciales	2,30 (1,40 - 3,78)	0,001	1,98 (1,18 - 3,34)	0,010
Killip-Kimball > I al ingreso	4,99 (3,05 - 8,17)	<0,001	2,83 (1,64 – 4,87)	<0,001
Horario de tarde en el centro	1,15 (0,75 - 1,75)	0,523	1,12 (0,69 – 1,81)	0,649
Presentación en horario no laborable	0,97 (0,62 – 1,50)	0,881	0,95 (0,58 – 1,56)	0,858
Modelo 2. Día no laborable vs día laborable				
Edad (años)	1,05 (1,03 - 1,07)	<0,001	1,03 (1,00 – 1,05)	0,016
Diabetes Mellitus	2,51 (1,64 - 3,83)	0,001	1,63 (1,02 – 2,61)	0,040
Fragilidad	1,98 (1,05 – 3,74)	0,036	1,05 (0,52 – 2,14)	0,889
Enfermedad renal crónica	4,08 (2,50 - 6,66)	<0,001	2,12 (1,22 – 3,68)	0,007
Infarto de miocardio previo	1,61 (1,02 - 2,55)	0,042	1,17 (0,71 – 1,95)	0,528
Presentación clínica como IAMSEST	2,81 (1,43 - 5,48)	0,003	2,27 (1,12 – 4,60)	0,023
Cambios electrocardiográficos iniciales	2,30 (1,40 - 3,78)	0,001	1,95 (1,16 - 3,30)	0,012
Killip-Kimball > I al ingreso	4,99 (3,05 - 8,17)	<0,001	2,80 (1,63 – 4,84)	<0,001
Horario de tarde en el centro	1,15 (0,75 - 1,75)	0,523	1,10 (0,70 – 1,74)	0,676
Presentación en día no laborable	0,69 (0,43 - 1,23)	0,135	0,76 (0,45 – 1,25)	0,279

IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: *odds ratio*.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

Tabla S4. Análisis de los pacientes que presentaron el evento principal extrahospitalario

	Evento extrahospitalario (n=141)	Sin evento extrahospitalario (n=832)	p
Edad (años)	69,9 ± 11,1	65,6 ± 12,9	**<0,001**
Sexo femenino (%)	43 (30,5)	187 (22,5)	**0,038**
Índice de masa corporal (kg/m²)	28,1 ± 4,9	27,7 ± 4,7	0,358
Características clínicas basales			
Hipertensión arterial (%)	114 (80,9)	556 (66,8)	**0,001**
Diabetes Mellitus (%)	60 (42,6)	269 (32,3)	**0,009**
Enfermedad cerebrovascular (%)	20 (14,2)	48 (5,8)	**0,001**
Enfermedad renal crónica (%)	34 (24,1)	77 (9,3)	**<0,001**
EPOC (%)	18 (12,8)	82 (9,9)	0,293
Fibrilación/Flutter auricular (%)	16 (11,3)	57 (6,9)	0,061
Insuficiencia cardiaca (%)	18 (12,8)	24 (2,9)	**<0,001**
Infarto de miocardio previo (%)	59 (41,8)	163 (19,6)	**0,001**
Fragilidad (%)	26 (18,4)	52 (6,3)	**<0,001**
Características asistenciales			
Se realiza actividad de tarde (%)	64 (45,4)	351 (42,2)	0,477
Se realiza actividad de fin de semana para casos seleccionados (%)	28 (19,9)	144 (17,3)	0,767
2 o más salas de intervencionismo (%)	87 (61,7)	532 (63,9)	0,580
6 o más hemodinamistas (%)	32 (22,7)	203 (24,4)	0,105
Momento del ingreso			
Ingreso durante el horario laboral (%)	45 (31,9)	293 (35,2)	0,446
Ingreso en día laborable (%)	94 (66,7)	569 (68,4)	0,685
Situación clínica al ingreso			
IAMSEST al ingreso (%)	102 (72,3)	643 (77,3)	0,339
Alteraciones en el ECG (%)	89 (63,1)	503 (60,5)	0,549
Killip-Kimball > I (%)	30 (21,3)	68 (8,2)	**0,001**
Parada cardiorrespiratoria (%)	0 (0,0)	3 (0,4)	0,999
Arritmias ventriculares (%)	1 (0,7)	4 (0,5)	0,541
Pico de CPK (g/dl)	230,5 ± 292,8	373,4 ± 780,3	0,123
Coronariografía			
Tiempo hasta la coronariografía (h)	41 (20 – 71)	36 (19 – 70)	0,072
Test no invasivo previo (%)	15 (10,6)	64 (7,7)	0,236

CPK: creatinfosfocinasa; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

Tabla S5. Modelo multivariable para el evento combinado tras la hospitalización


	HR cruda (IC95%)	p	HR ajustada (IC 95%)	p
Modelo 1. Horario no laborable vs horario laborable				
Edad (años)	1,03 (1,02 - 1,04)	<0,001	1,01 (0,99 - 1,03)	0,252
Sexo masculino	0,64 (0,45 - 0,92)	0,016	0,74 (0,50 - 1,10)	0,132
Diabetes Mellitus	1,60 (1,14 - 2,25)	0,007	0,95 (0,65 - 1,38)	0,784
Hipertensión arterial	2,08 (1,35 - 3,22)	0,001	1,36 (0,85 - 2,17)	0,201
Fragilidad	3,37 (2,11 - 5,38)	<0,001	1,97 (1,17 - 3,30)	0,010
Enfermedad renal crónica	2,80 (1,88 - 4,17)	0,001	1,61 (1,00 - 2,58)	0,050
Infarto de miocardio previo	2,75 (1,96 - 3,88)	<0,001	2,18 (1,51 - 3,16)	0,001
Insuficiencia cardiaca previa	4,24 (2,58 - 6,97)	<0,001	2,03 (1,14 - 3,61)	0,017
Horario de tarde en el centro	1,13 (0,81 - 1,59)	0,480	1,10 (0,76 - 1,59)	0,607
Presentación en horario no laborable	1,21 (0,84 - 1,74)	0,309	1,22 (0,83 - 1,81)	0,313
Modelo 2. Día no laborable vs día laborable				
Edad (años)	1,03 (1,02 - 1,04)	<0,001	1,01 (0,99 – 1,03)	0,234
Sexo masculino	0,64 (0,45 - 0,92)	0,016	0,75 (0,50 - 1,11)	0,151
Diabetes Mellitus	1,60 (1,14 - 2,25)	0,007	1,63 (1,02 – 2,60)	0,042
Hipertensión arterial	2,08 (1,35 - 3,22)	0,001	1,36 (0,85 - 2,17)	0,202
Fragilidad	3,37 (2,11 - 5,38)	<0,001	1,98 (1,18 - 3,32)	0,010
Enfermedad renal crónica	2,80 (1,88 - 4,17)	0,001	1,59 (0,99 - 2,58)	0,056
Infarto de miocardio previo	2,75 (1,96 - 3,88)	<0,001	2,19 (1,52 - 3,18)	<0,001
Insuficiencia cardiaca previa	4,24 (2,58 - 6,97)	<0,001	2,00 (1,12 - 3,58)	0,019
Horario de tarde en el centro	1,13 (0,81 - 1,59)	0,480	1,04 (0,73 - 1,48)	0,822
Presentación en día no laborable	1,06 (0,74 - 1,52)	0,749	1,04 (0,71 - 1,52)	0,821


HR: *hazard ratio*; IC95%: intervalo de confianza del 95%.


https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637


FIGURAS

Figura S1. Curvas de supervivencia para los eventos extrahospitalarios.










https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637


Figura S2. Efecto de la presentación clínica en horario no laborable vs horario laborable en diferentes subgrupos.



OR: *odds ratio*; IC95%: intervalo de confianza del 95%.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M26000637

Figura S3. Efecto de la presentación clínica en día no laborable vs. día laborable en diferentes subgrupos.



OR: *odds ratio*; IC95%: intervalo de confianza del 95%.