

MATERIAL ADICIONAL


Tabl 1 del material adicional

Descripción de la intervención TAVI (n = 76)

Intervención	n	%
<i>Bicúspide, sí</i>	0	0,00
<i>Aleteo auricular, sí</i>	22	28,90
<i>Valve-in-valve, sí</i>	6	7,90
<i>Abordaje vascular</i>		
Femoral derecho	71	93,40
Femoral izquierdo	5	6,60
<i>Ecocardiografía</i>		
Transexofágica	1	1,30
Transtorácica	75	98,70
<i>Predilatación (nº de balones antes del implante)</i>		
0	70	92,10
1	4	5,30
2	1	1,30
3	1	1,30
<i>Cierre</i>		
Angio-Seal	1	1,30
Surgical	4	5,30
ProGlide	71	93,40
<i>Anestesia</i>		
General	1	1,30
Sedación	75	98,70


TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

Figura 1 del material adicional. Estimación de la mortalidad en la muestra global



Distribuciones estimadas de simulaciones del riesgo de mortalidad a 1 año en la población global de referencia (2018) emparejadas por edad y sexo de pacientes incluidos en el estudio SARU (puntuación del riesgo de la escala STS PROM no incluida en el ajuste). Según esto, las tasas de mortalidad vistas en nuestro estudio parecen similares a las de la población general si se tiene en cuenta que las puntuación del riesgo de la escala STS PROM no fueron incluida en los ajustes (Datos del Instituto Nacional de Estadística, <https://www.ine.es/>).

Figura 2 del material adicional. Resultados ecocardiográficos al seguimiento en la práctica clínica habitual



Poso: posoperatorio; STS: *Society of Thoracic Surgeons*.