

MATERIAL ADICIONAL

Tabla 1 del material adicional

Resultados de los modelos (univariantes) de regresión de Cox para cada uno de los posibles factores de MACE y del modelo multiestado para cada transición ajustado con cada uno de los posibles factores. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; IRC: insuficiencia renal crónica; TCI: enfermedad de tronco coronario izquierdo. Se muestra en negrita las variables significativas para el modelo de Cox y para cada transición del modelo multiestado.

	Regresión de Cox para MACE	Modelo multiestado						
		Tratam. → Sangrado	Tratam. → IAM/RV	Tratam. → Muerte	Sangrado → IAM/RV	Sangrado → Muerte	IAM/RV → Sangrado	IAM/RV → Muerte
Edad	0.99 (0.97,1.02)	0.98 (0.94,1.03)	0.96 (0.91,1.01)	1.03 (0.99,1.07)	1.01 (0.87,1.17)	1.02 (0.93,1.10)	0.93 (0.77,1.13)	0.99 (0.88,1.11)
Sexo	0.95 (0.74, 1.21)	0.87 (0.58,1.32)	1.19 (0.77,1.86)	0.79 (0.51,1.21)	0.95 (0.24,3.66)	0.77 (0.34,1.72)	0.42 (0.05,3.73)	0.61 (0.19,1.91)
Diabetes	1.40 (1.12, 1.75)	1.33 (0.91, 1.95)	1.55 (1.01, 2.38)	1.36 (0.92, 1.99)	3.15 (0.81,12.16)	1.44 (0.71, 2.91)	0.61 (0.11, 3.67)	1.05 (0.38, 2.89)
Dislipemia	1.27 (0.99, 1.61)	1.17 (0.78, 1.74)	2.02 (1.21, 3.37)	1.17 (0.78, 1.75)	1.4 x 10 ⁵ (0,1.1 x 10 ¹⁴⁸)	0.59 (0.29, 1.20)	0.83 (0.09, 7.42)	0.57 (0.18, 1.79)
Tabaquismo	1.07 (0.74, 1.53)	1.19 (0.68, 2.08)	0.83 (0.40,1.72)	0.93 (0.49, 1.74)	1.81 (0.38, 8.52)	1.07 (0.38, 3.06)	9.29 x 10 ⁻⁵ (0,5 x 10 ¹³¹)	1.79 (0.40, 7.93)
IRC	1.64 (1.29, 2.05)	1.69 (1.14, 2.50)	1.23 (0.79, 1.89)	1.96 (1.30, 2.95)	1.61 (0.42, 6.23)	1.45 (0.68, 3.08)	4.82 (0.54,43.17)	3.31 (1.06, 10.41)
Anemia	1.36 (1.08, 1.71)	2.12 (1.44, 3.12)	1.23 (0.78, 1.93)	1.68 (1.13, 2.48)	3.73 (0.79,17.58)	0.99 (0.49, 2.01)	5.43 (0.61,48.59)	0.90 (0.32, 2.55)
FEVI	0.99 (0.98, 1.00)	0.99 (0.97, 1.00)	0.99 (0.98, 1.01)	0.98 (0.96, 0.99)	0.96 (0.92, 1.00)	0.95 (0.92, 0.97)	1.01 (0.92,1.11)	0.95 (0.91, 0.99)
IAM previo	1.36 (1.08, 1.73)	1.20 (0.79, 1.83)	1.64 (1.05, 2.56)	1.84 (1.24, 2.73)	3.31 (0.96,11.42)	1.58 (0.74, 3.35)	0.38 (0.04, 3.39)	0.55 (0.18,1.73)

Cirugía coronaria pre	0.91 (0.59, 1.39)	1.24 (0.65, 2.38)	1.62 (0.11, 1.13)	0.36 (0.11, 1.13)	3.7×10^{-5} ($0,3.0 \times 10^{184}$)	3.49 (1.34, 9.11)	1.67×10^{-5} ($0,1 \times 10^{220}$)	0.42 (0.05, 3.17)
TCI tratada	1.37 (0.97, 1.93)	1.70 (0.99, 2.89)	0.74 (0.32, 1.70)	1.63 (0.94, 2.81)	7.27 (2.10,25.10)	0.77 (0.24, 2.56)	1.68 (0.19,15.18)	0.48 (0.06, 3.68)
Hemorragias Mayores previas	1.74 (1.21, 2.52)	3.10 (1.77, 5.44)	2.79 (1.44, 5.39)	1.49 (0.69, 3.20)	2.3×10^{-5} ($0,4.3 \times 10^{121}$)	0.98 (0.37, 2.51)	7.67 (1.28, 45.9)	1.77 (0.40, 7.84)
Número vasos tratados	1.29 (1.08, 1.54)	1.24 (0.93,1.66)	0.94 (0.64, 1.38)	1.42 (1.07, 1.88)	0.76 (0.23, 2.56)	1.13 (0.62, 2.07)	1.48 (0.32,6.74)	1.19 (0.46, 3.06)
Precise-DAPT	1.03 (1.02, 1.04)	1.05 (1.03, 1.06)	1.03 (1.00, 1.05)	1.04 (1.02, 1.05)	1.04 (0.99, 1.09)	1.02 (0.99, 1.04)	1.06 (1.01,1.12)	1.03 (0.99, 1.07)
HAS-BLED	1.27 (1.11, 1.44)	1.04 (0.83, 1.30)	0.87 (0.66, 1.14)	1.59 (1.30, 1.95)	0.87 (0.44, 1.71)	1.01 (0.71, 1.43)	5.45 (1.77,16.74)	0.98 (0.46, 2.09)
Cáncer activo	2.07 (1.28, 3.32)	2.69 (1.25, 5.79)	0.94 (0.24, 3.82)	2.36 (1.03, 5.37)	1.4×10^{-5} ($0,8.8 \times 10^{276}$)	2.29 (2.83, 226.5)	25.32 (2.83, 226)	2×10^{-4} ($0,4 \times 10^{140}$)

Tabla 2 del material adicional

Descripción de las características basales de los pacientes expresadas en porcentaje y valor promedio. Se refleja también el número de eventos adversos observados durante el seguimiento. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; IRC: insuficiencia renal crónica; TCI: enfermedad de tronco coronario izquierdo.

Características basales de los pacientes	
<i>Edad</i>	81.1 ± 4.2
<i>Varones</i>	710 (67.1 %)
<i>Diabetes</i>	535 (42.8%)
<i>Dislipemia</i>	803 (64.3%)
<i>Tabaquismo</i>	103 (10.6 %)
<i>IRC</i>	499 (47.2 %)
<i>Anemia</i>	518 (41.5%)
<i>FEVI</i>	55.0 ±10.3
<i>IAM previo</i>	333 (26.7%)
<i>Cirugía coronaria pre</i>	91 (7.3 %)
<i>TCI tratada</i>	116 (9.3%)
<i>Hemorragias Mayores previas</i>	77 (6.2%)
<i>Enfermedad multivaso</i>	410(32.1%)
<i>Número de vasos tratados</i>	1.40±0.65
<i>Número de lesiones tratadas</i>	1.59±0.53
<i>Precise-DAPT</i>	31.8 ± 11
<i>HAS-BLED</i>	2.85 ± 0.84
<i>Cáncer previo</i>	161(12.9%)

Tabla 3 del material adicional

Número y porcentaje de eventos adversos observados durante el seguimiento: al año, a los 1.000 días y a los 5 años.

Evento adverso (EA)	EA → 1 año	EA → 1.000 días	EA → 5 años
Muerte	104 (9,8%)	149 (14,1%)	162 (15,3%)
Muerte cardiaca	51 (4,8%)	64 (6,1%)	68 (6,4%)
Infarto de miocardio	43 (4,1%)	60 (5,7%)	61 (5,8%)
Revascularización	56 (5,3%)	69 (6,5%)	70 (6,6%)
Sangrado mayor	99 (9,4%)	112 (10,6%)	116 (11,0%)